

大腸がんレジメン

mFOLFOX6療法						インターバル
オキサリプラチン	85	mg/m ²	120分	点静	day1	14日間
レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点静	day1	
5FU(Bolus)	400	mg/m ²	5分	点静	day1	
5FU(Continuous)	2,400	mg/m ²	46時間	持続	day1	
特記事項						

XELOX療法						インターバル
オキサリプラチン	130	mg/m ²	120分	点静	day1	21日間
カペシタビン	下記参照		朝夕食後	内服	day1-14	
特記事項						
体表面積当たりのカペシタビンの投与量						
1.36m ² 未満：1,200mg/回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満：1,500mg/回						
1.66m ² 以上1.96m ² 未満：1,800mg/回 1.96m ² 以上：2,100mg/回						

FOLFIRI療法						インターバル
イリノテカン	150	mg/m ²	120分	点静	day1	14日間
レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点静	day1	
5FU(Bolus)	400	mg/m ²	5分	点静	day1	
5FU(Continuous)	2,400	mg/m ²	46時間	持続	day1	
特記事項						

mFOLFOXIRI療法						インターバル
イリノテカン	150	mg/m ²	60分	点静	day1	14日間
オキサリプラチン	85	mg/m ²	120分	点静	day1	
レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点静	day1	
5FU(Continuous)	2,400	mg/m ²	46時間	持続	day1	
特記事項						
最大12サイクルまで						

IRIS (CPT-11/S-1) 療法						インターバル
イリノテカン	80	mg/m ²	90分	点静	day1,15	28日間
S-1	下記参照		朝夕食後	経口	day1-14	
特記事項						
体表面積当たりのS-1の投与量						
1.25未満：40mg/回 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：50mg/回 1.5m ² 以上：60mg/回						
イリノテカンの投与量は、原著 (Lancet Oncol. 2010 Sep;11(9):853-60) では125mg/m ²						

大腸がんレジメン

I-LV/5-FU療法						インターバル
レボホリナート	250	mg/m ²	120分	点静	day1,8,15,22,29,36	48日間
5-FU	600	mg/m ²	5分	点静	day1,8,15,22,29,36	
特記事項						

mFOLFOX6/BV療法						インターバル
ペバシズマブ	5	mg/kg	90分	点静	day1	14日間
オキサリプラチン	85	mg/m ²	120分	点静	day1	
レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点静	day1	
5FU(Bolus)	400	mg/m ²	5分	点静	day1	
5FU(Continuous)	2,400	mg/m ²	46時間	持続	day1	
特記事項						
ペバシズマブは初回90分、2回目以降60分で投与						

XELOX/BV療法						インターバル
オキサリプラチン	130	mg/m ²	120分	点静	day1	21日間
カペシタビン	下記参照		朝夕食後	経口	day1-14	
ペバシズマブ	7.5	mg/kg	90分→短縮	点静	day1	
特記事項						
体表面積当たりのカペシタビンの投与量						
1.36m ² 未満：1,200mg/回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満：1,500mg/回						
1.66m ² 以上1.96m ² 未満：1,800mg/回 1.96m ² 以上：2,100mg/回						

FOLFIRI/BV療法						インターバル
ペバシズマブ	5	mg/kg	90分	点静	day1	14日間
イリノテカン	150	mg/m ²	120分	点静	day1	
レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点静	day1	
5FU(Bolus)	400	mg/m ²	5分	点静	day1	
5FU(Continuous)	2,400	mg/m ²	46時間	持続	day1	
特記事項						
ペバシズマブは初回90分、2回目以降60分で投与						

mFOLFOXIRI/BV療法						インターバル
ペバシズマブ	5	mg/kg	90分	点静	day1	14日間
イリノテカン	150	mg/m ²	60分	点静	day1	
オキサリプラチン	85	mg/m ²	120分	点静	day1	
レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点静	day1	
5FU(Continuous)	2,400	mg/m ²	46時間	持続	day1	
特記事項						
ペバシズマブは初回90分、2回目以降60分で投与						
最大12サイクルまで						

大腸がんレジメン

SIRB (S-1/CPT-11/BV) 療法						インターバル
ベバシズマブ	7.5	mg/kg	90分	点静	day1	21日間
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点静	day1	
S-1	下記参照		朝夕食後	経口	day1-14	
特記事項						
体表面積当たりのS-1の投与量						
1.25未満：40mg/回 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：50mg/回 1.5m ² 以上：60mg/回						
ベバシズマブは初回90分、2回目以降60分で投与						

ロンサーフ/BV療法						インターバル
ベバシズマブ	5	mg/kg	90分	点静	day1,15	28日間
ロンサーフ	下記参照		朝夕食後	経口	day1-5、8-12	
特記事項						
体表面積当たりのロンサーフの投与量						
1.07未満：35mg/回 1.07以上～1.23未満：40mg/回 1.23以上～1.38未満：45mg/回 1.38以上～1.53未満：50mg/回						
1.53以上～1.69未満：55mg/回 1.69以上～1.84未満：60mg/回 1.84以上～1.99未満：65mg/回						
1.99以上～2.15未満：70mg/回 2.15以上：75mg/回						
ベバシズマブは初回90分、2回目以降60分で投与						

5-FU/LV/BV療法						インターバル
ベバシズマブ	5	mg/kg	90分	点静	day1	14日間
レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点静	day1	
フルオロウラシル	2,400	mg/m ²	46時間	点滴	day1	
特記事項						
ベバシズマブは初回90分、2回目以降60分で投与						

Pmab療法						インターバル
ベクティビックス	6	mg/kg	60分	点静	day1	14日間
特記事項						
ベクティビックスの投与時間は初回60分、2回目以降30分まで短縮可能						

mFOLFOX6/Pmab療法						インターバル
ベクティビックス	6	mg/kg	60分	点静	day1	14日間
エルプラット	85	mg/m ²	120分	点静	day1	
レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点静	day1	
5FU(Bolus)	400	mg/m ²	5分	点静	day1	
5FU(Continuous)	2,400	mg/m ²	46時間	持続	day1	
特記事項						
ベクティビックスの投与時間は初回60分、2回目以降30分まで短縮可能						

大腸がんレジメン

FOLFIRI/Pmab療法						インターバル
ベクティビックス	6	mg/kg	60分	点静	day1	14日間
イリノテカン	150	mg/m ²	120分	点静	day1	
レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点静	day1	
5FU(Bolus)	400	mg/m ²	5分	点静	day1	
5FU(Continuous)	2,400	mg/m ²	46時間	持続	day1	
特記事項 ベクティビックスの投与時間は初回60分、2回目以降30分まで短縮可能						

FOLFIRI/Aflibercept療法						インターバル
ザルトラップ	4	mg/kg	60分	点静	day1	14日間
カンプト	150	mg/m ²	120分	点静	day1	
レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点静	day1	
5FU(Bolus)	400	mg/m ²	5分	点静	day1	
5FU(Continuous)	2,400	mg/m ²	46時間	持続	day1	
特記事項						

FOLFIRI/RAM療法						インターバル
サイラムザ	8	mg/kg	60分	点静	day1	14日間
イリノテカン	150	mg/m ²	120分	点静	day1	
レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点静	day1	
5FU(Bolus)	400	mg/m ²	5分	点静	day1	
5FU(Continuous)	2,400	mg/m ²	46時間	持続	day1	
特記事項						

ENCO/BIN/Cmab療法						インターバル
ビラフトビ	300	mg/kg	朝食後	経口	連日	14日間
メクトビ	90	mg/m ²	朝夕食後	経口	連日	
アービタックス	400	mg/m ²	120分	点静	day1*	
アービタックス	250	mg/m ²	5分	点静	day8*	
特記事項 BRAF変異陽性が適応 *アービタックスは初回は400mg/m ² 、2回目以降は250mg/m ² *アービタックスの投与時間は初回：120分、2回目以降：60分 ビラフトビ・メクトビは、減量を要した副作用が≦Grade1に回復し、合併する副作用がなければ、減量時と逆の段階を経て増量が可能 ビラフトビの減量規定 1段階減量：225mg 2段階減量:150mg メクトビの減量規定 1段階減量：60mg 2段階減量:30mg						