

胃がんレジメン

S-1/CDDP療法						インターバル
シスプラチン	60	mg/m ²	120分	点静	day8	35日間
S-1	下記参照		朝夕食後	経口	day1-21	
特記事項						
体表面積当たりのS-1の投与量						
1.25未満：40mg/回 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：50mg/回 1.5m ² 以上：60mg/回						

XP療法						インターバル
シスプラチン	80	mg/m ²	120分	点静	day1	21日間
カペシタビン	下記参照		朝夕食後	経口	day1-14	
特記事項						
体表面積当たりのカペシタビンの投与量						
1.36m ² 未満：1,200mg/回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満：1,500mg/回						
1.66m ² 以上1.96m ² 未満：1,800mg/回 1.96m ² 以上：2,100mg/回						

SOX療法						インターバル
オキサリプラチン	100	mg/m ²	120分	点静	day1	21日間
S-1	下記参照		朝夕食後	経口	day1-14	
特記事項						
体表面積当たりのS-1の投与量						
1.25未満：40mg/回 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：50mg/回 1.5m ² 以上：60mg/回						

S-1/CDDP/Trastuzumab療法						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	day1*	21日間
トラスツズマブ	6	mg/kg	90分	点静	day1*	
シスプラチン	60	mg/m ²	120分	点静	day1	
S-1	下記参照		朝夕食後	経口	day1-14	
特記事項						
体表面積当たりのS-1の投与量						
1.25未満：40mg/回 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：50mg/回 1.5m ² 以上：60mg/回						
*トラスツズマブは初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg						

XP/Trastuzumab療法						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	day1*	21日間
トラスツズマブ	6	mg/kg	90分	点静	day1*	
シスプラチン	80	mg/m ²	120分	点静	day1	
カペシタビン	下記参照		朝夕食後	経口	day1-14	
特記事項						
体表面積当たりのカペシタビンの投与量						
1.36m ² 未満：1,200mg/回 1.36m ² 以上1.66m ² 未満：1,500mg/回						
1.66m ² 以上1.96m ² 未満：1,800mg/回 1.96m ² 以上：2,100mg/回						
*トラスツズマブは初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg						

胃がんレジメン

SOX/Trastuzumab療法						インターバル
トラスツズマブ	8	mg/kg	90分	点静	day1*	21日間
トラスツズマブ	6	mg/kg	90分	点静	day1*	
オキサリプラチン	130	mg/m ²	120分	点静	(Day 1)	
S-1	下記参照		朝夕食後	day1-14	day1-14	
特記事項						
体表面積当たりのS-1の投与量						
1.25未満：40mg/回 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：50mg/回 1.5m ² 以上：60mg/回						
*トラスツズマブは初回は8mg/kg、2回目以降は6mg/kg						

SOX/ニボルマブ療法						インターバル
オブジーボ	360	mg/body	30分	点静	day1	21日間
オキサリプラチン	130	mg/m ²	120分	点静	day1	
S-1	下記参照		朝夕食後	day1-14	day1-14	
特記事項						
体表面積当たりのS-1の投与量						
1.25未満：40mg/回 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：50mg/回 1.5m ² 以上：60mg/回						

mFOLFOX6/ニボルマブ療法						インターバル
オブジーボ	240	mg/body	30分	点静	day1	14日間
オキサリプラチン	85	mg/m ²	120分	点静	day1	
レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点静	day1	
5FU(Bolus)	400	mg/m ²	15分	点静	day1	
5FU(Continuous)	2,400	mg/m ²	46時間	持続	day1	
特記事項						

S-1/DTX療法						インターバル
ドセタキセル	40	mg/m ²	60分	点静	day1	21日間
S-1	下記参照		朝夕食後	経口	day1-14	
特記事項						
体表面積当たりのS-1の投与量						
1.25未満：40mg/回 1.25m ² 以上1.5m ² 未満：50mg/回 1.5m ² 以上：60mg/回						
1年間のS-1内服に対し、 2コースより7コースまで DTXを併用						
以後再びS-1単独で継続する						
8コース目以降のS-1は4週服用2週休薬を基本とする						

胃がんレジメン

nab-PTX/RAM療法						インターバル
アブラキサ	100	mg/m ²	30分	点静	day1,8,15	28日間
サイラムザ	8	mg/kg	60分	点静	day1,15	
特記事項						

PTX/RAM療法						インターバル
パクリタキセル	80	mg/m ²	60分	点静	day1,8,15	28日間
サイラムザ	8	mg/kg	60分	点静	day1,15	
特記事項 パクリタキセルの前投薬：レスタミン錠10mg：5錠						

RAM療法						インターバル
サイラムザ	8	mg/kg	60分	点静	day1	14日間
特記事項						

ニボルマブ療法						インターバル
オブジーボ	240	mg/body	30分	点静	day1	14日間
特記事項						

Weekly PTX療法						インターバル
パクリタキセル	80	mg/m ²	60分	点静	day1,8,15	28日間
特記事項 パクリタキセルの前投薬：レスタミン錠10mg：5錠						

nab-PTX療法						インターバル
アブラキサ	260	mg/m ²	30分	点静	day1	21日間
特記事項						

CPT-11療法						インターバル
イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点静	day1	14日間
特記事項						

DTX療法						インターバル
ドセタキセル	60	mg/m ²	60分	点静	day1	21日間
特記事項						